

## Zaštita i ishrana bob, grah i grašak

KOROVI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi	PENDUS 330 EC	4-5 l/ha	OVP	nakon sjetve, a prije nicanja kulture (dozvola za bob i grašak)

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	smeđa pjegavost, hrde, paleži i bakterioze	NEORAM WG 	1,5 - 2 kg/ha	5 dana	u vegetaciji preventivno
	siva plijesan (Botrytis)	PYRUS 400 SC	1,5 l/ha	21 dan za grah i grašak	vegetaciji preventivno ili kod opasnosti od pojave bolesti
	pepelnica	COSAVET DF 	3 kg/ha	7 dana za grašak, 14 dana za grah	u vegetaciji, preventivno
	hrđa, palež	LEGADO	0,8 - 1 l/ha	nema	preventivno ili na početku infekcije

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	BROJ PR.	VRIJEME PRIM.
	tripsa, lisnih uši, pipe mahunarke, soвица pozemljuša i lisnih soвица	CYTHRIN MAX	0,1 l/ha	3 dana	2 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
	lisne uši, tripsi, bijela mušica, grinje i crveni pauk	SILMAX EC	75 - 100 ml u 100 l vode	nema	nije ograničen	u vegetaciji kod pojave štetnika



NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
Otpornost na biotički i biotički stres	FUSION	2 L/ha	nema	u fazi razvoja prvih troliski
Stimulacija cvatnje i oplodnje	SET	2 L/ha	nema	prije cvatnje
Prihrana dušikom i prevencija patogenih infekcije	N-LEAF 	0,5 L/ha	nema	nakon cvatnje
Biostimulativna prihrana Ca i Mg	MAGNICAL B	2 L/ha	nema	formiranje mahuna

**OKVAŠIV.** U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

 DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU