

Zaštita i ishrana jagode

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	crvena trulež korijena	NEORAM WG 	0,2 – 0,3 %	3 dana	prije pojave bolesti, preventivno na početku i tijekom vegetacije
	trulež korijena	MIKONOS EVO	2,5 L/ha	15 dana	u ZP, u uvjetima povoljnima za razvoj infekcije
	pepelnica	COSAVET DF 	0,2 % otopina	21 dan	u vegetaciji kod pojave simptoma
	siva plijesan	PYRUS 400 SC	2 l/ha	3 dana	preventivno u vegetaciji, kod opasnosti od pojave bolesti
	trulež korijena i korijenovog vrata	CYCLO R LIQUIDO	3 – 4 l/ha	40 dana	u vegetaciji preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIM.
	kalifornijski trips i sovice	LASER 	20-25 ml u 100l vode (utrošak 600 - 800 vode/ha)	3 dana	u vegetaciji kod pojave odraslih štetnika
	crveni pauk i kalifornijski trips, lisni miner	APACHE	0,15-1 l/ha	3 dana	u vegetaciji kod pojave štetnika
	lisne uši, tripsi, bijela mušica, crveni pauk	SILMAX EC	50 - 100 mL u 100L vode	nema	u vegetaciji kod pojave štetnika



NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
Bolje ukorjenjivanje	ROOT	5-10 L/ha (fertiligacija)	nema	nakon presađivanja
Otpornost na biotički i biotički stres	FUSION + MAGNICAL B	2 L/ha + 2 L/ha	nema	kroz vegetaciju
Otpornost na biotički i biotički stres i povećanje sadržaja šećera	FUSION + CANDY+	2 L/ha + 2 L/ha	nema	u zriobi plodova

Za folijarnu/fertiligacijsku prihranu preporučujemo primjenu TORA ENERGY formulacije vodotopivih gnojiva: START 10:45:10 + Me, BALANCE 20:20:20 + Me, ACTIVE 15:5:30 + 3Mg+Me

OKVAŠIV.

U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

 DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU