

Zaštita i ishrana krastavaca

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
zaštita u klijalištu	plamenjača i polijeganje rasada	PROPLANT	0,2 % otopina zalijevanjem 2-2,5 l/ha drip aplikacijom	3 dana	u vegetaciji preventivno

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	plamenjača	PROPLANT	1,5 l/ha prskanjem u polju ili 2 l/ha drip aplikacijom	3 dana	u vegetaciji preventivno ili kod pojave bolesti
	plamenjača	VITENE 45 WG	0,3 – 0,4 kg/ha	3 dana	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
	plamenjača, bakterioze i prratno djelovanje na botritis	NEORAM WG 	250 – 350 g/ 100 l vode	20 dana	u vegetaciji preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
	pepelnica	DOMARK 40 ME ili COSAVET DF 	1 l/ha 3-4 kg/ha	7 dana 7 dana	u vegetaciji preventivno ili kod pojave bolesti
	pepelnica	LEGADO	0,7-0,8 l/ha	3 dana	u ZP, preventivno ili na početku pojave infekcije
	botritis	PYRUS 400 SC	0,15-0,2 %	3 dana u ZP	u vegetaciji, preventivno ili kod pojave prvih simptoma bolesti, maksimalno 3 puta u vegetaciji

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	BROJ PR.	VRIJEME PRIM.
	žičnjaci, sovce pozemljuše	TRIKA EXPERT	10 - 15 kg/ha	OVP	1 put u vegetaciji	u redove kod sadnje, uz inkorporaciju
	crveni pauk, lisni mineri i tripsi	APACHE	0,15-1 l/ha	3 dana	2 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
	kalifornijski trips, lisni mineri	LASER 	0,04 - 0,05%	3 dana	2 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
	Lisne uši, štitarasti moljci	KRISANT EC 	0,75 l/ha ili 75 - 90 ml na 100 l vode	1 dan	2 puta	u vegetaciji kod pojave štetnika
	lisne uši (i A. nasturtii), bijela mušica, staklenički štitarasti moljac	CLOSER	0,2 l/ha	1 dan	2 puta u vegetaciji	u ZP, u vegetaciji kod pojave štetnika
	lisne uši, tripsi, bijela mušica, grinje i crveni pauk	SILMAX EC	75 – 100 ml u 100 l vode	nema	nije ograničen	u vegetaciji kod pojave štetnika




NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
Bolje ukorjenjivanje	ROOT	5-10 L/ha (fertiligacija)	nema	nakon presađivanja
Otpornost na biotički i biotički stres	FUSION	2 L/ha	nema	početak vegetativnog porasta
Stimulacija cvatnje i oplodnje	SET	2 L/ha	nema	prije cvatnje
Prihrana mikro elementima	COMBI MAX 	1 kg/ha	nema	početak berbe
Biostimulativna prihrana Ca i Mg	MAGNICAL B	2 L/ha (višekartno)	nema	puna berba

Za folijarnu/fertiligacijsku prihranu preporučujemo primjenu TORA ENERGY formulacije vodotopivih gnojiva: START 10:45:10 + Me, BALANCE 20:20:20 + Me, ACTIVE 15:5:30 + 3Mg+Me

OKVAŠIV.

U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospešuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

 DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU