

Zaštita i ishrana krumpira

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
prije sadnje	žičnjaci, sovce pozemljuše	TRIKA EXPERT	10 - 15 kg/ha	OVP	kod pojave štetnika

SUZBIJANJE ŠTETNIKA

TRIKA EXPERT 10-15 kg/ha

KOROVI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	jednogodišnji travni i širokolisni korovi	CENTIUM 36 CS	0,3 l/ha	OVP	nakon sadnje, a prije nicanja
	jednogodišnji i višegodišnji travni korovi	PENDUS 330 EC	4-5 l/ha	OVP	nakon sadnje, a prije nicanja
	jednogodišnji travni i širokolisni korovi	MAGNUM	50-60 g/ha	42 dana	kada je krumpir visine 10-20 cm
	jednogodišnji travni korovi	TARGA	0,5 - 1,5 l/ha	77 dana	kada korovi razviju 2-5 listova
	višegodišnji travni korovi	TARGA	1,5 - 3 l/ha	77 dana	kada su korovi visine 10-20 cm

SUZBIJANJE KOROVA

CENTINUM 36 CS 0,3 l/ha +
PENDUS 330 EC 4-5 l/ha

MAGNUM 50-60 g/ha
+ OPTIMUS

TARGA 0,5 - 3 l/ha

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	plamenjača	NEORAM WG	2,5-3 kg/ha	14 dana	preventivno, prije pojave bolesti
	plamenjača	VITENE 45 WG	0,3 - 0,33 kg/ha	7 dana	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
	plamenjača	LEIMAY S	0,5/ha	7 dana	preventivno, prije pojave bolesti
	plamenjača	FANTIC A	2,4 kg/ha	14 dana	u uvjetima povoljnima za razvoj bolesti
	plamenjača	MIKONOS EVO	2,5 L/h	15 dana	preventivno, prije pojave bolesti
	alternarija	LEGADO	0,5 l/ha	7 dana	prevetivno, prije pojave bolesti
	plamenjača i alternarija	ZIGNAL SUPER	0,35-0,5 l/ha	14 dana	preventivno, prije pojave bolesti

SUZBIJANJE BOLESTI

NEORAM WG 2,5-3 kg/ha

VITENE 45 WG 0,3 - 0,33 kg/ha

LEIMAY S 2,4 kg/ha

MIKONOS EVO 2,5 l/ha

FANTIC A 2,4 kg/ha

LEGADO 0,4-0,5 l/ha

ZIGNAL SUPER 0,35-0,5 l/ha

ZIGNAL SUPER 0,35-0,5 l/ha

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	krumpirova zlatica	CORAGEN 20 SC	50-60 ml/ha	14 dana	primjena u dozi 60 ml/ha u početku pojave krumpirove zlatice osiguravaju produljenje djelovanje
	krumpirova zlatica	LASER	100-150 ml/ha	7 dana	kod pojave štetnika
	lisne uši, krumpirova zlatica, krumpirov moljac	CYTHRIN MAX	80-10 ml/ha		kod pojave štetnika

SUZBIJANJE ŠTETNIKA

CORAGEN SC 50-60 ml/ha ili **LASER** 100-150 ml/ha

CYTHRIN MAX 80-10 ml/ha



NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
Povećanje otpornosti na biotički i abiotički stres	FUSION	2 L/ha	nema	u vegetaciji, do zatvaranja redova
Bolji rast gomolja	MAGNICAL B + NITRO S	2-3 l/ha + 5-7 l/ha	nema	u fazi rasta gomolja
Prihrana dušikom i prevencija patogenih infekcije	N-LEAF	0,5 l/ha		u fazi rasta gomolja
Biostimulativna prihrana kalijem	CANDY+	3 l/ha	nema	u fazi rasta gomolja

TORA ISHRANA

TORA N-LEAF 0,5 l/ha

TORA MAGNICAL B 2-3 l/ha + **TORA NITRO S** 5-7 l/ha

TORA CANDY+ 3 l/ha

TORA FUSION 2 l/ha

Za folijarnu/fertirigacijsku prihranu preporučujemo primjenu TORA ENERGY formulacije vodotopivih gnojiva: START 10:45:10 + Me, BALANCE 20:20:20 + Me, ACTIVE 15:5:30 + 3Mg+Me

OKVAŠIV. U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU

