

Strategija zaštite i ishrane kukuruza



KOROVI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	jednogodišnji travni i širokolisni korovi (koštan, muhari, svračice, sirak iz sjemena, abutilon, ambrozija, dikica, loboda, dvornik i dr.)	TONALE	1.7-2.0 l/ha	nakon sjetve, prije nicanja i nakon nicanja, najkasnije do 4 lista kukuruza
	jednogodišnji i višegodišnji travni i širokolisni korovi	PROLIX PLUS	440 g/ha	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-6 listova
	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi (ambrozija, šćir, loboda, dvornik, mračnjak, kamilica, osjak, slak i dr.)	MUSTANG	0.5 l/ha	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-5 listova
	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi (ambrozija, šćir, loboda, dvornik, mračnjak, kamilica, osjak, slak i dr.)	KALIMBA (dikamba)	0.6-0.75 l/ha	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-6 listova
	širokolisni korovi (abutilon, ambrozija, kužnjak, dikica, crna pomoćnica, loboda, dvornici, kiselica, samonikli suncokret, slakasti dvornik i mnogi drugi). Smanjuje zakorovljenost uskolisnim korovima (koštan i svračica)	FRAXION (mezotrión)	0.75-1.5 l/ha	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-8 listova
	jednogodišnji i višegodišnji travni i širokolisni korovi	PROLIX PLUS + 500 ml MUSTANG/KALIMBA ili 1L FRAXION	1 pak. dostatan za 1.2 do 1.5 ha ovisno o stupnju zakorovljenosti	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-6 listova
	jednogodišnji i višegodišnji travni, te djelomično neki širokolisni korovi	jednokratno TAROT 25DF / MAGNUM ili dvokratno TAROT 25 DF / MAGNUM	60 g/ha 30+30g/ha	nakon nicanja, kada kukuruz ima 1-7 listova

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	žičnjaci (<i>Agritotes sp.</i>), gusjenice, sovice pozemljuša (<i>Agrotis sp.</i>) i ličinke kukuruzne zlatice	TRIKA EXPERT	žičnjaci i sovice pozemljuše 10-15 kg/ha ličinke kukuruzne zlatice 12-15 kg/ha	tretiranjem u redove tijekom sjetve uz inkorporaciju u tlo za sve štetnike ili tijekom međuredne kultivacije uz obostranu inkorporaciju u tlo za smanjenje napada ličinki kukuruzne zlatice
	kukuruzni moljac, sovice, žute kukuruzne sovice, usjevne sovice i kukuruzna zlatica	CYTHRIN MAX	150 ml/ha	kod pojave štetnika
	kukuruzni moljac, sovice, žuta kukuruzna sovice, karadrina	CORAGEN 20 SC	150 ml/ha	u fazi odlaganja jaja, a prije ubušivanja gusjenica u stabljiku ili klip

TORA	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	Bolji početni porast i jači razvoj korijena	TORA APOLO NP 12:43 ili TORA P-SOIL	TORA APOLO NP 12:43: 20-30 kg/ha TORA P-SOIL: 0.5 l/ha	APOLO: uz sjetvu / P-SOIL: zemljišna primjena (pre-em) ili rani post-em (do 4 razvijena lista kukuruza)
	Ubrzanje metaboličkih procesa i povećanje prinosa	TORA TURBO CORN	2-3 L/ha	od 4. do 10. lista kukuruza
	Folijarna prihrana dušikom	TORA N-LEAF ili TORA NITRO S	N LEAF: 0.5 L/ha NITRO S: 10-20 L/ha	Do zadnjeg mogućeg ulaska u kukuruz
	Povećanje otpornosti na biotički i abiotički stres	TORA FUSION	2 L/ha	Ovisno o vremenskim uvjetima, do zadnjeg mogućeg ulaska u kukuruz

OKVAŠIV. U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

SUZBIJANJE KOROVA

TONALE 1,7-2,0 l/ha

PROLIX PLUS 440 g/ha

MUSTANG 0.5 l/ha

KALIMBA 0,75-1,2 l/ha

FRAXION 0.6-0.75 l/ha

PROLIX PLUS + KALIMBA / MUSTANG / FRAXION
1 pak. dostatan za 1.2 do 1.5 ha ovisno o stupnju zakorovljenosti

TAROT 25 DF / MAGNUM
jednokratno: 60 g/ha
dvokratno: 30+30g/ha

SUZBIJANJE ŠTETNIKA

TRIKA EXPERT
10-15 kg/ha

CYTHRIN MAX 150 ml/ha

CORAGEN 20 SC 150 ml/ha

TORA ISHRANA


TORA APOLO NP 12:43: 20-30 kg/ha
TORA P-SOIL: 0.5 l/ha

TORA TURBO CORN 2-3 l/ha

TORA NITRO-S 10-20 l/ha

TORA N-LEAF 0.5 l/ha

TORA FUSION 2 l/ha



Sjeme kukuruza

Selectis

HIBRID	Grupa zriobe	OPTIMALNA GUSTOĆA SKLOPA (biljaka/ha)	POTENCIJAL PRINOSA ZRNA ILI SILAŽE (t/ha)
MAS 335.i	FAO 350	82 000	>15
ZENEADE	FAO 390	82 000	>15
MAS 43.P	FAO 400	84 000	>15
MAS 405.D	FAO 410	80 000	>15
STARAK	FAO 410	80 000	>15
ZP 4790	FAO 430	78 000	>16
MAS 524.A	FAO 450	84 000	>16
ASTON	FAO 540	74 000 / 85 000	>80
SHANIYA	FAO 660	75 000	>80

