


Zaštita i ishrana kupusnjača

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
zaštita u klijalištu	polijeganje rasade	PROPLANT	0,2 % otopina za zalijevanje	OVP	preventivno prije pojave bolesti

KOROVI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi	PENDUS 330 EC	4-5 l/h	100 dana	8-10 dana prije presađivanja
	jednogodišnji travni i širokolisni korovi	CENTIUM 36 CS	0,25 l/ha	OVP	odmah nakon presađivanja

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	plamenjača	PROPLANT	1,4 l/ha	14 dana	preventivno ili kod pojave simptoma bolesti
	plamenjača	MIKONOS EVO	2,5 l/ha	15 dana	u uvjetima povoljnim za razvoj bolesti
	plamenjača, bijela hrđa, bakteri- oze, prstenasta pjegavost	NEORAM WG 	250- 350 g/100 l vode	20 dana	preventivno tijekom vegetacije

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	BROJ PR.	VRIJEME PRIM.
	žičnjaci, sovice pozemljuše	TRIKA EXPERT	10 - 15 kg/ha	OVP	1 put u vegetaciji	u redove kod sadnje, uz inkorporaciju
	buhaci, sovice pozemljuše i lisne sovice, kupusar, kupusni moljac, lisne uši, tripsi	CYTHRIN MAX	0,1 l/ha	3 dana	2 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
	kupusna sovica i sve gusjenice (Lepidoptera)	LASER 	0,3 - 0,4 l/ha	3 dana	2 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
	lisne uši, tripsi, bijela mušica	SILMAX EC	75 - 100 ml u 100 l vode	nema	nije ograničen	vegetaciji kod pojave štetnika
	kupusna sovica, kupusni moljac, kupusni bijelac, sovica gama, kupusna muha, štitasti moljac	BENEVIA*	0,4 - 0,5 l/ha 0,75 l/ha	7 dana kupus, brokula, cvjetača, kelj pupčar	2 puta u vegetaciji	vegetaciji kod pojave prvih jaja i gusjenica

*pripravak BENEVIA može se koristiti isključivo na temelju izvanredne dozvole Ministarstva poljoprivrede RH



NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
Bolje ukorjenjivanje	ROOT	2 L/ha	nema	nakon presađivanja
Otpornost na stres i prihrana mikro elementima	FUSION + COMBI MAX 	2 L/ha + 1 kg/ha	nema	formiranje rozete
Prihrana dušikom i prevencija patogenih infekcije	N-LEAF 	3-5 L/ha	nema	u fazi intenzivnog porasta
Ujednačeno dozrijevanje i prihrana kalijem i kalcijem	MAGNICAL B + CANDY+	2 L/ha + 2 L/ha	nema	drugi dio vegetacije
Suzbijanje bakterioza	BLUE	2 L/ha	nema	kroz vegetaciju

Za folijarnu/fertiligacijsku prihranu preporučujemo primjenu TORA ENERGY formulacije vodotopivih gnojiva:
START 10:45:10 + Me, BALANCE 20:20:20 + Me, ACTIVE 15:5:30 + 3Mg+Me

OKVAŠIV.

U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.