


## Zaštita i ishrana luka

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	plamenjača	PROPLANT	1,4 l/ha	7 dana za luk	vegetaciji preventivno, prije prvih vidljivih znakova bolesti
	plamenjača luka s popratnim djelovanjem na Botrytis i bakterioze	NEORAM WG 	0,25 – 0,35 % otopina	5 dana poriluk, 3 dana mladi luk, luk kozjak, luk i češnjak	vegetaciji preventivno (kada se stvore uvjeti povoljni za razvoj bolesti)

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	BROJ PR.	VRIJEME PRIM.
	žičnjaci, sovice pozemljuše	TRIKA EXPERT	10-15 kg/ha	OVP	1	prije sadnje (inkorporacija u tlo)
	trips, lisne uši, lisne sovice, sovice pozemljuše, lukov moljac	CYTHRIN MAX	0,1 l/ha	3 dana luk i češnjak	2 puta u vegetaciji	vegetaciji kod pojave štetnika
	kalifornijski trips, duhanov trips, sovice pozemljuše, lukov moljac	LASER 	0,2-0,4 l/ha (primjeniti 600 – 800 l vode/ha)	7 dana luk i češnjak	4 puta u vegetaciji	vegetaciji kod pojave štetnika
	lisne uši, tripsi	SILMAX EC	75 – 100 ml u 100 l vode	nema	nije ograničen	vegetaciji kod pojave štetnika
	lukova muha	BENEVIA*	0,75 l/ha	7 dana luk i češnjak	2 puta u vegetaciji	vegetaciji kod pojave prvih štetnika

\*pripravak BENEVIA može se koristiti isključivo na temelju izvanredne dozvole Ministarstva poljoprivrede RH



NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
Povećanje otpornosti na biotički i abiotički stres	FUSION	2 L/ha	nema	u početku razvoja rozete
Prihrana dušikom i prevencija patogenih infekcije	N-LEAF 	3-5 L/ha	nema	u fazi intenzivnog porasta
Suzbijanje bakterioza	BLUE	2 L/ha	nema	kroz vegetaciju

Za folijarnu/fertirigacijsku prihranu preporučujemo primjenu TORA ENERGY formulacije vodotopivih gnojiva: START 10:45:10 + Me, BALANCE 20:20:20 + Me, ACTIVE 15:5:30 + 3Mg+Me

### OKVAŠIV.

U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospešuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.



DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU