


Zaštita i ishrana mrkve, peršina i celera

KOROVI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi	PENDUS 330 EC	4-5 l/h	OVP	nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em): dozvola samo za celer
	jednogodišnji širokolisni korovi	CENTIUM 36 CS	0,25 l/ha	OVP	nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em), primjenjuje se jedanput u vegetacijskoj sezoni

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	lisna pjegavost (gljivice iz rodova Septoria i Cercospora) s poporlatnim djelovanjem na Fusarium i bakterioze	NEORAM WG 	0,25 -0,35 %	20 dana celer	vegetaciji preventivno ili kod pojave simptoma bolesti
	plamenjača	PROPLANT	2 l/ha	20 dana za peršin i bosiljak	u vegetaciji, preventivno ili nakon pojave prvih simptoma bolesti

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	BROJ PR.	VRIJEME PRIM.
	žičnjaci, sovice pozemljuše	TRIKA EXPERT	10 -15 kg/ha	OVP	1 put u vegetaciji	u redove kod sadnje, uz inkorporaciju
	sovica pozemljuše, lisne sovice, buhači, tripsi, lisne uši, kupusar	CYTHRIN MAX	0,1 l/ha	3 dana mrkva, celer, peršin, pastirjak, rotkvica, hren	2 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
	lisne uši, tripsi	SILMAX EC	75 - 100 ml u 100 l vode	nema	nije ograničen	u vegetaciji kod pojave štetnika
	mrkvina muha	BENEVIA*	0,6 - 0,75 l/ha	14 dana za mrkvu, celer, peršin korijen, pastirjak	2 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave prvih štetnika

*pripravak BENEVIA može se koristiti isključivo na temelju izvanredne dozvole Ministarstva poljoprivrede RH



NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
poboljšanje otpornosti biljaka na stres, povećanje usvajanja hranjiva	TORA ROOT	5 - 20 l /ha kroz sistem kap na kap	nema	nakon sadnje i tijekom vegetacije
Otpornost na biotički i biotički stres	FUSION	2 L/ha	nema	početak vegetativnog porasta
Prihrana dušikom i prevencija patogenih infekcije	N-LEAF 	0,5 L/ha	nema	u fazi intenzivnog porasta
Biostimulativna prihrana Ca i Mg	MAGNICAL B	2 L/ha	nema	u fazi intenzivnog porasta
Prihrana mikro elementima	COMBI MAX 	1 kg/ha	nema	u fazi intenzivnog porasta

Za folijarnu/fertirigacijsku prihranu preporučujemo primjenu TORA ENERGY formulacije vodotopivih gnojiva: START 10:45:10 + Me, BALANCE 20:20:20 + Me, ACTIVE 15:5:30 + 3Mg+Me

OKVAŠIV.

U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospešuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

 DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU