

Zaštita i ishrana paprike

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
zaštita u kljاليštu	plamenjača i polijeganje rasada	PROPLANT	0,2 % otopina zalijevanjem 2-2,5 l/ha drip aplikacijom	3 dana	u vegetaciji preventivno

KOROVI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi	PENDUS 330 EC	4-5 l/h	75 dana	8-10 dana prije presađivanja

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	plamenjača i polijeganje rasada	PROPLANT	0,2 % otopina zalijevanjem 2-2,5 l/ha drip aplikacijom	3 dana	u vegetaciji preventivno
	gangrena korijena	MIKONOS EVO	2,5 l/ha	15 dana	u ZP, u uvjetima povoljnima za razvoj infekcije
	pepelnica	COSAVET DF 	3-4 kg/ha	12 dana	u vegetaciji preventivno
	bakterioze	NEORAM WG 	150 – 200 g/100 l vode	5 dana	u vegetaciji preventivno
	pepelnica	LEGADO	0,8-1 L/ha	3 dana	u ZP, preventivno ili na početku pojave infekcije

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	BROJ PR.	VRIJEME PRIM.
	žičnjaci, sovce pozemljuše	TRIKA EXPERT 	10 - 15 kg/ha	OVP	1 puta u vegetaciji	u redove kod sadnje, uz inkorporaciju
	Lisne uši i štitasti moljci	KRISANT EC	0,75 l/ha ili 75 -90 ml na 100 l vode	1 dan	2 puta	u vegetaciji kod pojave štetnika
	kalifornijski trips	LASER 	0,03 – 0,05 %	7 dana	2 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
	lisne uši, tripsi, bijela mušica, grinje i crveni pauk	SILMAX EC	75 – 100 ml u 100 l vode	nema	nije ograničen	u vegetaciji kod pojave štetnika



NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
Bolje ukorjenjivanje	ROOT	5-10 L/ha (fertiligacija)	nema	nakon presađivanja
Otpornost na biotički i biotički stres	FUSION	2 L/ha	nema	početak vegetativnog porasta
Suzbijanje bakterioza	BLUE	2 L/ha	nema	kroz vegetaciju
Prihrana mikro elementima	COMBI MAX 	1 kg/ha	nema	kroz vegetaciju
Prevenција pojave vršne truleži	MAGNICAL B	2 L/ha	nema	na početku rasta plodova
Ujednačena zrioba	CANDY+	2 L/ha	nema	u fazi bojanja plodova

Za folijarnu/fertiligacijsku prihranu preporučujemo primjenu TORA ENERGY formulacije vodotopivih gnojiva: START 10:45:10 + Me, BALANCE 20:20:20 + Me, ACTIVE 15:5:30 + 3Mg+Me

OKVAŠIV.

U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospešuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.