

## Zaštita i ishrana patlidžana

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
zaštita u kljajalištu	polijeganje rasada (Phytlum spp.)	PROPLANT	0,2 % otopina za zalijevanje	3 dana	kada se stvore uvjeti optimalni za pojavu bolesti

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	plamenjača	PROPLANT	1,5-1,7 l/ha prskanjem u polju ili drip aplikacijom 2 l/ha	3 dana	vegetaciji preventivno
	trulež korijena, gumeze	MIKONOS EVO	2,5 l/ha	15 dana	u ZP, u uvjetima povoljnima za razvoj infekcije
	plamenjača	VITENE 45 WG	0,27 kg/ha	3 dana	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
	antraknoza s popratnim djelovanjem na botritis i	NEORAM WG	0,25 – 0,35 %	3 dana	prije pojave bolesti, preventivno na početku i tijekom vegetacije
	plamenjača	LEIMAY S	0,4 – 0,6 l/ha	3 dana	u vegetaciji, prije pojave bolesti

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	BROJ PR.	VRIJEME PRIM.
	žičnjaci, štetne gusjenice, zemljišni štetnici	TRIKA EXPERT	10 - 15 kg/ha	OVP	1 put u vegetaciji	kod pripreme tla, prije sadnje ili u sjetvi
	Štitasti moljci	KRISANT EC	0,75 l/ha ili 75 - 90 ml na 100 l vode	1 dan	2 puta	u vegetaciji kod pojave štetnika
	kalifornijski tripa, duhanov trips	LASER	0,4 l/ha	2 dana	3 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
	sovica pozemljuša, lisne sovice, krumpirov moljac, krumpirova zlatica (gdje nema rezistentnost krumpirove zlatice na piretroide), lisne uši, cvrčak, tripsa i stakleničkog št. moljca	CYTHRIN MAX	0,1 l/ha	3 dana	2 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
	crveni pauk, hrđasta grinja rajčice i tripsi	APACHE	0,15-0,8 l/ha	3 dana	3 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
	sovica gama, žuta kukuruzna sovica, sovica, karadrine	CORAGEN 20 SC	150 – 200 ml/ha	1 dan	1 put u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
	lisne uši, tripsi, bijela mušica, crveni pauk	SILMAX EC	50 – 100 ml u 100 l vode	nema	nije ograničen	u vegetaciji kod pojave štetnika



NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
Bolje ukorjenjivanje	ROOT	5-10 L/ha (fertiligacija)	nema	nakon presađivanja
Otpornost na biotički i biotički stres	FUSION	2 L/ha	nema	kroz vegetaciju
Prihrana dušikom i prevencija patogenih infekcije	N-LEAF	0,5 L/ha	nema	prije cvatnje
Stimulacija cvatnje i oplodnje	SET	2 L/ha	nema	prije cvatnje
Prevencija pojave vršne truleži	MAGNICAL B	2 L/ha (više kartno)	nema	na početku rasta plodova

Za folijarnu/fertiligacijsku prihranu preporučujemo primjenu TORA ENERGY formulacije vodotopivih gnojiva: START 10:45:10 + Me, BALANCE 20:20:20 + Me, ACTIVE 15:5:30 + 3Mg+Me

### OKVAŠIV.

U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospešuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.



DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU