

## Zaštita i ishrana ruže, krizanteme i ljetnice

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	Phytophthora vrste	PROPLANT	25 ml/10 l vode (0,2 l/biljci)	primjena zalijevanjem
	pepelnica	COSAVET DF 	30 g/10 l vod	preventivno, prije pojave simptoma bolesti
	plamenjača, antraknoza, hrđa s popratnim djalovanjem na bakterioze	NEORAM WG 	0,25 – 0,35 %	preventivno, prije pojave simptoma bolesti
	pepelnica, hrđa i pjegavost lista	DOMARK 40 ME	10 ml/10 l vode 5 ml/10 l vode	preventivno, prije pojave simptoma bolesti
	siva plijesan (Botrytis)	PYRUS 400 SC	20 ml/10 l vode/100 m <sup>2</sup>	uvegetaciji, preventivno; tretirati u više navrata


ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	žičnjaci, sovice pozemljuše	TRIKA EXPERT	10 - 15 kg/ha	u redove kod sadnje, uz inkorporaciju
	lisne uši, tripsi, mujehe lisnih minera, lisne sovice i sovice, štitasti moljac	CYTHRIN MAX	0,01 – 0,02 % (1 – 2 ml/10 l vode)	u vegetaciji kod pojave štetnika
	tripsi, muhe lisnih minera	LASER 	0,04 – 0,05 %	u vegetaciji kod pojave štetnika
	lisne uši (mlječikina, pamukova, breskvina, aphid nasturtii), bijela mušica, staklenički štitasti moljac	CLOSER	0,2 l/ha	u ZP, u vegetaciji kod pojave štetnika



NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
Otpornost na biotički i biotički stres	FUSION	2 L/ha	nema	kroz vegetaciju
Prihrana Ca i Mg	MAGNICAL B	2 L/ha	nema	kroz vegetaciju

### OKVAŠIV.

U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospešuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

 DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU