

Zaštita i ishrana salate

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
zaštita u kljajalištu	polijeganja rasade (Phytilium spp i Bremia lactucae)	PROPLANT	0,2 % otopina 2 x u razmaku 7 – 10 dana	21 dana za salatu, cikoriju, endiviju i radič	u vegetaciji preventivno ili kod opasnosti od pojave bolesti

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
	plamenjača	PROPLANT	0,2% otopina zalijevanjem ili 1,4-1,5 l/ha prskanjem na polju ili u ZP	21 dana za salatu, cikoriju, endiviju i radič	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
	plamenjača salate	VITENE 45 WG	0,3 – 0,4 kg/ha	10 dana	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
	plamenjača salate	MIKONOS EVO	2,5 L/ha	15 dana	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
	plamenjača, pjegavosti lista i antraknoza s popratnim djelovanjem na bakterioze	NEORAM WG	0,25-0,35 % (250 - 350 g/100 l vode)	20 dana	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
	plamenjača	LEGADO	0,8-1 L/ha	14 dana	preventivno, ili na početku razvoja infekcije
	botrytis	PYRUS 400 SC	2 l/ha	21 dan	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
	plamenjača	LEIMAY S	0,4 – 0,6 l/ha	3 dana	u vegetaciji, prije pojave bolesti

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	BROJ PR.	VRIJEME PRIM.
	žičnjaci, sovice pozemljuše	TRIKA EXPERT	10 - 15 kg/ha	OVP	1 put u vegetaciji	u redove kod sadnje,
	žuta kukuruzna sovica	LASER	0,3 l/ha	3 dana	3 puta u vegetaciji	uz inkorporaciju
	muhe lisni mineri, crveni pauk i mekokožne grinje	APACHE	0,15-1 l/ha	7 dana	3 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika (primjeniti nakon odlaganja jaja ili nakon izlaska prvih gusjenica)
	Lisne uši (uključivo Nasonovia rib.)	KRISANT EC	0,6 l/ha ili 75 - 90 ml na 100 l vode	2 dana	2 puta	u vegetaciji kod pojave štetnika



NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
Bolje ukorjenjivanje	ROOT	5-10 L/ha (fertiligacija)	nema	nakon presađivanja
Otpornost na biotički i biotički stres i prihrana mikro elementima	FUSION COMBI MAX	2 L/ha 1 kg/ha	nema	formiranje rozete
Biostimulativna prihrana Ca i Mg i prihrana tekućim dušikom	MAGNICAL B + NITRO S	2 L/ha + 3-5 L/ha	nema	drugi dio vegetacije

Za folijarnu/fertiligacijsku prihranu preporučujemo primjenu TORA ENERGY formulacije vodotopivih gnojiva: START 10:45:10 + Me, BALANCE 20:20:20 + Me, ACTIVE 15:5:30 + 3Mg+Me

OKVAŠIV.

U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospešuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU