

Strategija zaštite i ishrane strnih žitarica



KOROVI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	travni korovi (slakoperka, mišji repak, ljuljevi, divlja zob, stoklasa i dr.); širokolisni korovi (bročika, jarmen, rusomača, čestoslavica, mišjakinja, mrtva kopriva, gorušica, ljubica i dr.). Primjena u pšenici, raži i tritikalu, ne u ječmu i zobi.	PALLAS 75WG	250 g/ha	od faze razvoja dva lista do drugog koljenca (BBCH 12-32)
	širokolisni korovi (osjak, kamilica, jarmen, ambrozija ...)	MUSTANG	0.5-0.6 l/ha	od početka busanja do prvog koljenca (BBCH 21-31)
		LANCELOT SUPER	33 g/ha	od početka busanja do prvog koljenca (BBCH 21-31)
	jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi	FLAME DUO	40-60 g/ha	kada je vrh klasa najmanje 1 cm iznad mjesta izduživanja do stadija vidljivog jezičca zastavice (od veljače do srpnja)

SUZBIJANJE KOROVA

PALLAS 75 WG 250 g/ha

MUSTANG 0.5-0.6 l/ha

LANCELOT SUPER 33 g/ha

FLAME DUO 40-60 g/ha

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	hrđe (<i>Puccinia spp.</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđa pjegavost (<i>Septoria tritici</i>)	MIZONA	0,75-1 l/ha	T1 ili T2 (od vlatanja do klasanja)
	<i>Septoria spp.</i> , <i>Puccinia spp.</i> , <i>Pyrenophora teres</i> , <i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Fusarium spp.</i>	PROMINO XTRA	1,4 l/ha	od početka vlatanja do završetka klasanja (T1 - T3)
	hrđa, palež, pjegavost	JAGUAR	1 l/ha	od vlatanja do završetka cvatnje (T2 i T3)
	pepelnica, hrđe, pjegavosti lista i pljevica	FUNGICID PACK TETRAX (tetrakonazol + azoksistrobin)	jedan DUO PACK na 1-1,25 ha	u pšenici T1 i T2 tretman, od početka vlatanja do klasanja (dozvola samo za pšenicu)
	pepelnica, hrđe, pjegavosti lista i palež klasa	FUNGICID PACK PRODOM (tetrakonazol + protiokonazol)	jedan DUO PACK na 1 ha	od vlatanja do završetka cvatnje (T2 i T3) (dozvola samo za pšenicu)

SUZBIJANJE BOLESTI

MIZONA 0,75-1 l/ha

PROMINO XTRA 1,4 l/ha

JAGUAR 1 l/ha

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	žitni balac (lema), lisne uši, usjevna sovica i drugi štetnici	CYTHRIN MAX	50 ml/ha	u vrijeme pojave štetnika, u jesen s ciljem suzbijanja lisnih ušiju (vektori viroza)

SUZBIJANJE ŠTETNIKA

CYTHRIN MAX 50 ml/ha



NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
Stimulacija busanja nakon zimskog perioda	TORA ROOT + TORA FUSION	2 l/ha + 1 l/ha	od busanja do početka vlatanja
Ubrzanje metaboličkih procesa, bolje nalijevanje zrna i povećanje prinosa	TORA TURBO CEREALS	2-3 l/ha	od vlatanja do cvatnje
Održiva prihrana dušikom	TORA N-LEAF	0,5 L/ha	od početka vlatanja
Folijarna i kontinuirana prihrana dušikom	TORA NITRO S	15-20 L/ha	od formiranja lista zastavice do cvatnje

TORA ISHRANA


TORA TURBO CEREALS 2-3 l/ha

TORA NITRO-S 10-20 l/ha

TORA N-LEAF 0.5 l/ha

TORA ROOT 2 l/ha + TORA FUSION 1 l/ha

OKVAŠIV. U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.



Sjeme strne žitarice

Selectis

HIBRID	HEKTOLITARSKA MASA ZRNA (kg/Hl)	SADRŽAJ PROTEINA U ZRNU (%)	POTENCIJAL PRINOSA (kg/ha)
MONVISO (ozima pšenica)	76-83	12,5-14,5	>11000
PINOKIO (ozima pšenica)	75-80	12,5-14,5	> 10000
BASALTIC (ozima pšenica)	77-83	12-15	> 10000
CONSTEL (ozimi ječam)	60-70	12,5-14,5	> 9000
COLLIE (ozimi ječam)	68-72	12,5-14,5	> 9000
BONJOUR (ozimo-jari tritikal)	76-80	12-15	> 9000

