


Zaštita i ishrana šumarstvo

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	uzročnici polijeganja rasada (Phytophthora spp. i Pythium spp.)	PROPLANT	0,2 %-tna otopina za zalijevanje	šumski rasadnici
	pepelnica hrasta, hrđa topole i trulež divljeg kestena	DOMARK 40 ME	0,06-0,2 %	šumski rasadnici, šumski nasadi
	plamenjača, antraknoza, hrđa s popratnim djelovanjem na bakterioze	NEORAM WG 	0,25 – 0,35 %	ukrasno bilje
	pepelnica	COSAVET DF 	0,2 – 0,3 %	šumski rasadnici, šumski nasadi

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	žičnjaci, sovice pozemljuše	TRIKA EXPERT	10 - 15 kg/ha	redove kod sadnje, uz inkorporaciju
	lisne uši, johina šarena pipa, strizibuba, gubar	CYTHRIN MAX	0,004 – 0,01 %	šumarski rasadnici, mladi nasadi, topole
	savijači i kestenova pipa	CORAGEN 20 SC	180 ml/ha	od početka odlaganja jaja
	lisne uši, tripsi, bijela mušica, grinje i crveni pauk	SILMAX EC	50 – 100 ml u 100 l vode	rasadnici i šumski nasadi



NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
Otpornost na biotički i biotički stres	FUSION	2 L/ha	nema	tijekom vegetacije
Prihrana dušikom i prevencija patogenih infekcije	N-LEAF 	0,5 L/ha	nema	tijekom vegetacije
Stimulacija cvatnje i oplodnje	SET	2 L/ha	nema	tijekom vegetacije
Prihrana mikro elementima	COMBI MAX	1 kg/ha	nema	tijekom vegetacije

OKVAŠIV.

U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.



DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU