

Strategija zaštite i ishrane uljane repice



KOROVI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi	KOBAN 600	1,5 - 2 L/ha	nakon sjetve, a prije nicanja
	jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi	CENTIUM 36 CS	0,33 l/ha	primjenjuje se samostalno ili u kombinaciji s drugim zemljišnim herbicidima
	Preporuka je za cjelovitu pre-em zaštitu od korova KOBAN 600 i CENTIUM 36 CS primjeniti zajedno.			
	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	LONTREL 600	0,2 l/ha	2 - 9 razvijenih listova repice (BBCH 12 - 19)
	širokolisni korovi (kamilice, jarmen, osjak, mak, dimnjača, priljepača, mrtva kopriva, iglice i drugi)	KORVETTO	1 l/ha	u proljeće, od početka izduživanja stabljike do početka cvatnje ozime uljane repice (BBCH 30-50) (nakon sjetve, a prije nicanja)
	jednogodišnji travni korovi	TARGA	1,5-2 l/ha	kada su korovi u fazi 2-5 listova
	samonikle žitarice	TARGA	1-1,5 l/ha	kada su samonikle žitarice u fazi tri lista do sredine busanja
	višegodišnji travni korovi	TARGA	1,5-2,5 l/ha	kada su korovi visine 10-20 cm

SUZBIJANJE KOROVA

KOBAN 600 1,5 - 2 L/ha

CENTIUM 36 CS 0,33 l/ha

LONTREL 600 0,2l/ha

KORVETTO 1 l/ha

TARGA 1,5-2 l/ha - kada su korovi u fazi 2-5 listova
1-1,5 l/ha - kada su samonikle žitarice u fazi tri lista do sredine busanja
1,5-2,5 l/ha - kada su korovi visine 10-20 cm

BOLESTI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	plamenjača	NEORAM WG	2,5 - 3 kg/ha	kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti
	Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) Koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)	PROMINO XTRA	1,2 L/ha	U uvjetima povoljnima za razvoj bolesti (od stadija "žutog pupa" do završetka cvatnje

SUZBIJANJE BOLESTI

NEORAM WG 2,5 - 3 kg/ha

NEORAM WG 2,5 - 3 kg/ha

PROMINO XTR 1,2 kg/ha

ŠTETNICI	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	žičnjaci (Agrotis sp.) i gusjenice sovice pozemljuša (Agrotis sp.)	TRIKA EXPERT	10-15 kg/ha	tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju u tlo
	buhači, ose listarice, repina pipa mala, repina pipa velika, repina pipa komušarica i dr. štet.	CYTHRIN MAX	50 ml/ha	kod pojave štetnika

SUZBIJANJE ŠTETNIKA

TRIKA EXPERT 10-15 kg/ha

CYTHRIN MAX 50 ml/ha

TORA	NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
	bolji početni porast / stimulacija razvoja korijenovog sustava	TORA APOLO NP 12:43 / TORA P- SOIL	15-40 kg/ha / 0,5 L/ha	uz sjetvu / zemljišna primjena (pre-em) ili rani post-em
	stimulacija vegetacije nakon zimskog perioda	TORA ROOT + TORA FUSION	3L/ha + 2 L/ha	rano proljeće
	ubrzanje metaboličkih procesa i povećanje prinosa	TORA TURBO OILSEEDS	2-3 L/ha	od početka izduživanja stabljike do početka cvatnje

TORA ISHRANA

OKVAŠIV. U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

TORA APOLO NP 12:43 15-40 kg/ha

TORA P-SOIL 0,5 L/ha

TORA TURBO OILSEEDS 2-3 l/ha

TORA ROOT 3 l/ha +
TORA FUSION 2 L/ha

