



SUZBIJANJE ZEMLJIŠNIH ŠTETNIKA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
žičnjaci (<i>Agriotes</i> sp.), gusjenice sovice pozemljuša (<i>Agrotis</i> sp.) i ličinke kukuruzne zlatice (<i>Diabrotica virgifera</i>)	TRIKA EXPERT	žičnjaci i sovice pozemljuše 10-15 kg/ha ličinke kukuruzne zlatice 12-15 kg/ha	tretiranjem u redove tijekom sjetve uz inkorporaciju u tlo za sve štetnike ili tijekom međuredne kultivacije uz obostranu inkorporaciju u tlo za smanjenje napada ličinki kukuruzne zlatice

SUZBIJANJE KOROVA


NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
jednogodišnji travni i širokolisni korovi (koštan, kuhari, ambrozija, loboda, abutilon i dr.)	KOBAN TX	4.0 l/ha	poslije sjetve, prije nicanja i nakon nicanja do 4 lista kukuruza
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi (limundžik, šćir, loboda, dvornik, mračnjak, kamilica, osjak, slak i dr.)	MUSTANG	0.6 l/ha	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-5 listova
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi (limundžik, šćir, loboda, dvornik, mračnjak, kamilica, osjak, slak i dr.)	KALIMBA	0.6-0.75 l/ha	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-8 listova
jednogodišnji i višegodišnji travni i širokolisni korovi	PRINCIPAL PLUS 66,5 WG + OPTIMUS	440 g/ha + 0.025%	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-6 listova
jednogodišnji i višegodišnji travni i širokolisni korovi	DUOPAK PRINCIPAL PLUS 66,5 WG (440g) + KALIMBA (500ml) + OPTIMUS	1 pak. dostatan za 1.2 do 1.5 ha ovisno o stupnju zakorovljenosti	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-6 listova
jednogodišnji i višegodišnji travni i te djelomično neki širokolisni korovi	jednokratno TARTOT 25 DF + OPTIMUS ili dvokratno TARTOT 25 DF + OPTIMUS	60 g/ha + 0.025% 30+30g/ha + 0.025%	nakon nicanja, kada kukuruz ima 1-7 listova

SUZBIJANJE ŠTETNIKA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
kukuruzni moljac, sovice, žute kukuruzne sovice, usjevne sovice i kukuruzna zlatica	CYTHRIN MAX	150 ml/ha	kod pojave štetnika
kukuruzni moljac	CORAGEN 20 SC	150 ml/ha	u fazi odlaganja jaja

SPECIJALNA GNOJIVA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
biostimulator	MEGAFOL	2-3 l/ha	zaštita usjeva od biotskih i abiotskih astresova
folijarno gnojivo	PLANTAFOL 20:20:20	1-3 kg/ha	dodatna prihrana usjeva



U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.