



SUZBIJANJE ZEMLJIŠNIH ŠTETNIKA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	BROJ PRIMJ.	VRIJEME PRIMJENE
Žičnjaci Sovice Pozemljuše	TRIKA EXPERT	10-15 kg/ha	OPV	1	inkorporacija prije sadnje tretiranjem u redove

SUZBIJANJE KOROVA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
jednogodišnji širokolisni korovi	SENAT WG	0,5-0,75 kg/ha	42 dana	8-10 dana nakon presađivanja rajčice, ako su korovi iznikli
travni i širokolisni korovi	TAROT 25 DF + SENAT WG	60 g/ha + 0,4 kg/ha	42 dana	8-10 dana nakon presađivanja rajčice, ako su korovi iznikli

SUZBIJANJE BOLESTI

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
plamenjača i crna pjegavost	NEORAM WG 	1,25-1,75 kg/ha	14 dana	u vegetaciji preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
polijeganje rasada i plamenjača u polju	PROPLANT	0,2% otopina zalijevanjem 1,5-1,7 l/ha prskanjem	3 dana	u vegetaciji preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
plamenjača i crna pjegavost	EQUATION PRO ili FANTIC M	0,4-0,6 kg/ha 2-2,5 kg/ha	7 dana 3 dana	u vegetaciji preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
pepelnica, baršunasta plijesan, koncentrična pjegavost, hrđa i pjegavost lišća	DIFCOR	0,5 l/ha	7 dana	u vegetaciji preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
baršunasta plijesan pepelnica	DOMARK 40 ME COSAVET DF 	0,6-1,6 l/ha 3-4 kg/ha	4 dana 12 dana	u vegetaciji preventivno ili kod pojave bolesti
siva plijesan (Botrytis)	PYRUS 400 SC	2 l/ha	3 dana	u vegetaciji preventivno ili kod pojave bolesti
pepelnica (leveillula taurica)	SYSTHANE 20 EW	0,375 l/ha	3 dana	u vegetaciji preventivno ili kod pojave bolesti
suzbijanje biljnih bolesti povećanjem otpornosti biljaka	KENDAL	2 l /ha	nema	u vegetaciji, prije pojave bolesti
suzbijanje biljnih bolesti i bakterioza	KENDAL TE 	2 l /ha	nema	u vegetaciji, prije pojave bolesti

SUZBIJANJE ŠTETNIKA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	BROJ PRIMJENA	VRIJEME PRIMJENE
sovice pozemljuše, lisne sovice, lisne uši, tripsi, staklenički štيتasti moljac	CYTHRIN MAX	0,1 l/ha	3 dana	2 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
lisne sovice, kukuruzni moljac, karadrine i lisni mineri	AVAUNT EC	0,25 l/ha	3 dana	3 puta u vegetaciji	u vegetaciji za suzbijanje jaja i ličinki; tretirati nakon prve pojave štetnika
crveni pauk, hrdasta grinja rajčice, Tuta absoluta, lisni mineri i tripsi	APACHE	0,15-1 l/ha	3 dana	2 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
sovice gama, žuta kukuruzna sovica, sovica, karadrine	CORAGEN 20 SC	150 – 200 ml/ha	1 dan	2 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
lisne uši(mlječikina, pamukova, breskvina), bijela mušica, staklenički štيتasti moljac	CLOSER	0,2 l/ha	1 dan	1 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
lisne uši, tripsi, bijela mušica, grinje i crveni pauk	SILMAX EC	50 – 100 ml u 100 l vode	nema	nije ograničen	u vegetaciji kod pojave štetnika
suzbijanje nematoda i patogena u tlu	KENDAL ROOT	5 – 20 l /ha kroz sistem kap na kap	nema	nije ograničen	nakon sadnje i tokom vegetacije
koprivina i ostale grinje	ACRAMITE 480 SC	0,2-0,375 l/ha	3 dana	2 puta u vegetaciji	odmah nakon pojave štetnika