


SALATA program zaštite




SUZBIJANJE ZEMLJIŠNIH ŠTETNIKA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	BROJ PRIMJ.	VRIJEME PRIMJENE
Žičnjaci Sovice Pozemljuše	TRIKA EXPERT	10-15 kg/ha	OPV	1	inkorporacija prije sadnje tretiranjem u redove


SUZBIJANJE KOROVA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
polijeganja rasade (Phytium spp i Bremia lactucae)	PROPLANT	0,2 % otopina 2 x u razmaku 7 - 10 dana	21 dana za salatu, cikoriju, endiviju i radič	u vegetaciji preventivno ili kod opasnosti od pojave bolesti

SUZBIJANJE BOLESTI

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	VRIJEME PRIMJENE
plamenjača	PROPLANT	0,2% otopina zalijevanjem ili 1,4-1,5 l/ha prskanjem na polju ili u ZP	21 dana za salatu, cikoriju, endiviju i radič	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
plamenjača, pjegavosti lista i antraknoza s popratnim djelovanjem na bakterioze	NEORAM WG 	0,25-0,35 % (250 - 350 g/100 l vode)	20 dana	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
alternarija	DIFCOR	0,5 l/ha	14 dana	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
botrytis	PYRUS 400 SC	2 l/ha	21 dan	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
plamenjača	CYCLO R LIQUIDO	3 - 4 l/ha	21 dan	u vegetaciji, preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
suzbijanje biljnih bolesti povećanjem otpornosti biljaka	KENDAL 	2 l /ha	nema	u vegetaciji, prije pojave bolesti
suzbijanje biljnih bolesti i bakterioza	KENDAL TE	2 l /ha	nema	u vegetaciji, prije pojave bolesti

SUZBIJANJE ŠTETNIKA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	KARENCA	BR.PRIMJENA	VRIJEME PRIMJENE
žuta kukuruzna sovica	LASER 	0,3 l/ha	3 dana	3 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika (primjeniti nakon odlaganja jaja ili nakon izlaska prvih gusjenica)
muhe lisni mineri	APACHE	0,15-1 l/ha	7dana	3 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika
lisne uši (Nasonovia ribisnigri, Myzus persicae)	CLOSER	0,2 l/ha	7 dana	1 puta u vegetaciji	u vegetaciji kod pojave štetnika