



SUZBIJANJE ZEMLJIŠNIH ŠTETNIKA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
žičnjaci (<i>Agriotes</i> sp.) i gusjenice sovica pozemljuša (<i>Agrotis</i> sp.)	TRIKA EXPERT	10-15 kg/ha	tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju u tlo

SUZBIJANJE KOROVA


NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi	SENAT WG	0,5-1,0 kg/ha	nakon sjetve, a prije nicanja soje
	HARMONY SX + OPTIMUS	12 -15 g/ha + 0,025 %	faza soje od od prve troliske do početka cvatnje soje (BBCH 12-14), a korovi u stadiju 2 do 4 lista
širokolisni korovi	HARMONY SX + OPTIMUS	2 x 7,5 g/ha + 0,025 %	prva primjena nakon nicanja soje kod BBCH 12, a druga kod BBCH 14, kada korovi imaju 2 do 4 lista. Razmak između tretiranja je 7-14 dana
(HARMONY SX pospješuje djelovanje na ambroziju, lobodu, osjak i neke druge korove)			
jednogodišnji travni korovi	TARGA + OPTIMUS	1,5 -2 l/ha + 0,025 %	kada su korovi u fazi 2-5 listova
višegodišnji travni korovi	TARGA + OPTIMUS	1,5 - 2,5 l/ha + 0,025 %	kada su korovi visine 10-20 cm

SUZBIJANJE BOLESTI

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
plamenjača	NEORAM WG	2,5 - 3 kg/ha	kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti

SPECIJALNA GNOJIVA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
biostimulator	MEGAFOL	2-3 l/ha	zaštita usjeva od biotskih i abiotskih astresova
folijarno gnojivo	PLANTAFOL 20:20:20	1-3 kg/ha	dotatna prihrana usjeva



U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.