

STRNE ŽITARICE program zaštite



SUZBIJANJE KOROVA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
pšenica, raž, tritikale (ne u ječmu i zobi) suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova (obična slakoperka, ljuljjevi, mišji repak, bročika, kamilica, mrtva kopriva, mišjakinja, osjak)	CORELLO DUO + OPTIMUS	265 g/ha + 0.025%	nakon nicanja kulture (post em) od stadija prvog lista do drugog koljenca (BBCH 11-32)
pšenica, raž, tritikale (ne u ječmu i zobi) travni korovi (slakoperka, mišji repak, ljuljjevi, divlja zob, stoklasa i dr.) te jednogodišnji širokolisni korovi	PALLAS 75 WG + OPTIMUS	250 g/ha + 0.025%	od faze razvoja dva lista do drugog koljenca (BBCH 12-32)
širokolisni korovi (bročika, kamilica, osjak, slak, mišjakinja, gorušica, grahorice, mak...)	MUSTANG	0.5-0.6 l/ha	od početka busanja do prvog koljenca (BBCH 21-31)
	LANCELOT SUPER	33 g/ha	od početka busanja do drugog koljenca (BBCH 21-32)
širokolisni korovi (osjak, kamilica, samonikli suncokret ...)	LONTREL 300	0.3 l/ha	od sredine busanja do drugog koljenca (BBCH 25-32)

SUZBIJANJE ŠTETNIKA


NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
lisne uši, žitni balac i drugi štetnici	CYTHRIN MAX	50 ml/ha	u vrijeme pojave štetnika

SUZBIJANJE BOLESTI

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
rana i kasna pojava pepelnice i hrđe, bolesti polijeganja, pjegavost lista	IMPACT 25 SC	0.5 l/ha	od sredine busanja do klasanja
rana i kasna pojava pepelnice i hrđe, bolesti polijeganja, pjegavost lista i klasa te palež klasa pšenice	YAMATO	1.5-1.75 l/ha	od sredine busanja do pune cvatnje

SPECIJALNA GNOJIVA

NAMJENA	SREDSTVO	KOLIČINA	VRIJEME PRIMJENE
biostimulator	MEGAFOL	2-3 l/ha	zaštita usjeva od biotskih i abiotskih astresova
folijarno gnojivo	PLANTAFOL 20:20:20	1-3 kg/ha	dodatna prihrana usjeva



U svim tretiranjima preko lista, preporučujemo dodati i okvašivač OPTIMUS koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.