

BUBRENJE PUPOVA (B-C)



NAMJENA I SREDSTVO	KONCENTRACIJA	KOLIČINA U 100 L VODE
KRASTAVOST NEORAM WG	0,5 %	500 g
ŠTITASTE UŠI PYXAL PROXIMO	0,0375-0,05 % 0,04-0,05 %	37,5-50 ml 40-50 ml
JAJA CRVENOG PAUKA I LISNIH UŠI mineralno ulje		

MIŠJE UŠI (C3)



NAMJENA I SREDSTVO	KONCENTRACIJA	KOLIČINA U 100 L VODE
KRASTAVOST NEORAM WG + FOLPAN 80 WDG ili DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC	0,5 % 0,2 % 0,2-0,25 % 0,2-0,25 %	500 g 200 g 200-250 g 200-250 g
PEPELNICA COSAVET DF	0,5-0,6 %	500-600 g
ŠTITASTE UŠI PYXAL PROXIMO	0,0375-0,05 % 0,04-0,05 %	37,5-50 ml 40-50 ml

CRVENE GLAVICE (D)



NAMJENA I SREDSTVO	KONCENTRACIJA	KOLIČINA U 100 L VODE
KRASTAVOST DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili FOLPAN 80 WDG + PYRUS 400 SC	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 % 0,075 %	200-250 g 200-250 g 200 g 75 ml
PEPELNICA COSAVET DF ili CRYSTAL	0,5-0,6 % 0,025-0,03 %	500-600 g 25-30 ml

POČETAK CVATNJE (F)



NAMJENA I SREDSTVO	KONCENTRACIJA	KOLIČINA U 100 L VODE
KRASTAVOST I PEPELNICA DITHANE DG NEOTEC ili DITHANE M-45 + PYRUS 400 SC ili INDAR 5 EW ili DIFCOR	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,075 % 0,06 % 0,015 %	200-250 g 200-250 g 75 ml 60 ml 15 ml
PEPELNICA CRYSTAL	0,02-0,03 %	20-30 ml

PUNA CVATNJA (G)



NAMJENA I SREDSTVO	KONCENTRACIJA	KOLIČINA U 100 L VODE
KRASTAVOST I PEPELNICA DITHANE DG NEOTEC ili DITHANE M-45 + PYRUS 400 SC ili INDAR 5 EW ili DIFCOR ili DOMARK 40 ME	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,075 % 0,06 % 0,015 % 0,05-0,1 %	200-250 g 200-250 g 75 ml 60 ml 15 ml 50-100 ml

POSLIJE CVATNJE (H)



NAMJENA I SREDSTVO	KONCENTRACIJA	KOLIČINA U 100 L VODE
KRASTAVOST I PEPELNICA DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN 80 WDG + INDAR 5 EW ili DIFCOR	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 % 0,06 % 0,015 %	200-250 g 200-250 g 200 g 60 ml 15 ml
CRVENI VOČNI PAUK KRAFT 18 EC ili APACHE	0,075-0,1 % 0,06-0,096 %	75-100 ml 60-96 ml

PROLJETNO SUZBIJANJE KOROVA



NAMJENA I SREDSTVO	KONCENTRACIJA	KOLIČINA U 100 L VODE
JEDNOGODIŠNJI I VIŠEGODIŠNJI KOROVI SATELITE	1-1,5%	1-1,5 l
Tretiranje se provodi uz potrošnju 200-300 litara vode po hektaru, prskanjem u trake		

II. PRSKANJE POSLIJE CVATNJE (I)



NAMJENA I SREDSTVO	KONCENTRACIJA	KOLIČINA U 100 L VODE
KRASTAVOST I PEPELNICA DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC + DOMARK 40 ME	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,05-0,1%	200-250 g 200-250 g 50-100 ml
JABUČNI SAVIJAČ CORAGEN 20 SC ili DELEGATE 250 WG ili RUNNER 240 SC	0,018 % 0,03 % 0,04%	18 ml 30 g 40 ml

III. PRSKANJE POSLIJE CVATNJE (J)



NAMJENA I SREDSTVO	KONCENTRACIJA	KOLIČINA U 100 L VODE
KRASTAVOST I PEPELNICA DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC + DOMARK 40 ME	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,05-0,1%	200-250 g 200-250 g 50-100 ml
JABUČNI SAVIJAČ CORAGEN 20 SC ili DELEGATE 250 WG ili RUNNER 240 SC	0,018 % 0,03 % 0,04%	18 ml 30 g 40 ml

IV. PRSKANJE POSLIJE CVATNJE (J)



NAMJENA I SREDSTVO	KONCENTRACIJA	KOLIČINA U 100 L VODE
KRASTAVOST I PEPELNICA DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC + DOMARK 40 ME	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,05-0,1%	200-250 g 200-250 g 50-100 ml
SAVIJAČI POKOŽICE PLODA RUNNER 240 SC ili CORAGEN 20 SC	0,04 % 0,018 %	40 ml 18 ml
CRVENI PAUK, KOPRIVINA GRINJA, RDASTA GRINJA KRAFT 18 EC APACHE	0,075-0,1 % 0,06-0,096 %	75-100 ml 60-96 ml

LJETNO TRETIRANJE*



* U ljetnim tretiranjima od sredine lipnja, prskanja treba provoditi preventivnim fungicidima u razmacima 10-14 dana, ovisno o vremenu.

NAMJENA I SREDSTVO	KONCENTRACIJA	KOLIČINA U 100 L VODE
KRASTAVOST I PEPELNICA DITHANE M-45/DG NEOTEC ili MERPAN® 80 WDG + COSAVET DF ili CRYSTAL	0,2-0,25 % 0,2 % 0,3-0,5 % 0,025-0,03 %	200-250 g 200 g 300-500 g 25-30 ml
LISNI MINERI, JABUČNI SAVIJAČ CORAGEN 20 SC ili RUNNER 240 SC ili DELEGATE 250 WG	0,018 % 0,04 % 0,03 %	18 ml 40 ml 30 g
SKLADIŠNE BOLESTI TOPSIN M 500 SC	0,15 %	150 ml

LJETNO SUZBIJANJE KOROVA



NAMJENA I SREDSTVO	KONCENTRACIJA	KOLIČINA U 100 L VODE
JEDNOGODIŠNJI I VIŠEGODIŠNJI KOROVI SATELITE	1-1,5%	1-1,5 l
Tretiranje se provodi uz potrošnju 200-300 litara vode po hektaru, prskanjem u trake		

NAPOMENA ZA SVA TRETIRANJA: U svim tretiranjima, preporučamo dodati i okvašivač **MASTER WETT**, koji pospješuje prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.